



Рис. 4. а — схема движения шарика после бифуркации; б — фазовый портрет.

Среди разл. Б. при анализе моделей физ. систем особенно интересны т. н. локальные. Это Б., при к-рых происходит перестройка отл. движений динамич. системы. Простейшими и наиб. важными из них являются Б. состояний равновесия и периодич. движений.

Бифуркации состояний равновесия. Осн. Б. состояний равновесия: 1) слияние и последующее исчезновение двух состояний равновесия. Примером может служить движение шарика в потенциальной яме с «полочкой» (рис. 3). При сглаживании полочки BD состояния равновесия седло S и центр C_2 сливаются и исчезают (рис. 4).

2) Рождение предельного цикла из состояния равновесия. Пример такой Б.— переход простейшего лампового генератора при соответствующем изменении управляющего напряжения от режима статич. колебаний к автоколебат. режиму (см. Автоколебания). В этом случае на фазовой плоскости (x, \dot{x}) из устойчивого фокуса в начале координат при коэф. затухания $\alpha > 0$ рождается предельный цикл (табл. 1, строка 4), амплитуда к-рого при малых α порядок $\sqrt{\alpha}$, а фокус становится неустойчивым.

3) Рождение из одного равновесного состояния трёх состояний равновесия (спонтанное нарушение симметрии). Напр., изменению движения шарика в жёлобе при появлении на дне жёлоба бугорка соответствует Б., при к-рой из вырожденного состояния равновесия типа центр (рис. 5, а) возникают три состояния равновесия

Табл. 1. — Рождение периодических движений

Характер возникновения периодических движений (автоколебаний)	Фазовый портрет до бифуркации	В момент бифуркации	После бифуркации	Модель	Комментарии
1. Жёсткое по амплитуде и мягкое по частоте				Ур-ние для амплитуд генератора Ван дер Поля, находящегося под действием периодич. силы $\ddot{x} = a [1 - (a^2 + b^2)] - \Delta \omega b - a_{\text{вн}}$ $b = b [1 - (a^2 + b^2)] - \Delta \omega a$ ($\Delta \omega$ —расстройка частоты)	В исходных (неусреднённых) ур-ниях $\ddot{x} - \mu(1 - x^2)\dot{x} + x = A \sin \theta$, $\theta = \omega$ этой бифуркации соответствует рождение тора, что в эксперименте отвечает переходу неавтономного осциллятора из режима синхронизации в режим бисений
2. «»				Ур-ние Ван дер Поля — Дюффинга $\ddot{x} = \mu(1 - x^2)\dot{x} + x - x^3 = 0$	Для стационарных волн в неравновесных средах такая Б. соответствует переходу от квазигармонич. волн к солитону и затем — квондальной волне
3. Жёсткое по амплитуде и по частоте				Ур-ние автогенератора с жёстким возбуждением $\ddot{x} + \mu(1 - x^2 + \alpha x^4)\dot{x} + x = 0$	Одна из наиб. типичных бифуркаций рождения или исчезновения периодич. движений
4. Мягкое по амплитуде и жёсткое по частоте				Ур-ние Ван дер Поля $\ddot{x} - (\alpha - x^2)\dot{x} + x = 0$	Бифуркация Андронова — Хопфа встречается в самых разл. областях физики
5. Мягкое по амплитуде и мягкое по частоте					Такая бифуркация осуществляется при варьировании двух или более параметров. Встречается в ур-ниях гидродинамики